AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 13-3-81668592

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

70/50 F.

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE PROTECTION DES VEGETAUX

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X. Sous Régisseur de recettes et d'avances AVERTISSEMENTS AGRICOLES 13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

ABONNEMENT ANNUEL

13. Route de la FORET - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39 02

BULLETIN nº 191

(Edition Grandes Cultures n°2/81 du 9.3.81)

CULTURES TOUTES

CAMPAGNOLS DES CHAMPS

Les résultats des piègeages d'hiver (décembre-janvier) et des contrôles de fin février sont réunis dans le tableau figurant au verso

Les températures très inférieures à la normale de Janvier et Février ont provoqué une chute importante du niveau des populations nais dans une moindre mesure, dans les zones où les populations étaient plus jeunes et où la reproduction s'est prolongé en novembre et parfois en décembre.

En fin Février-début Mars, on constate une reprise nette de la reproduction.

En conséquence il est, dès à présent possible de dire que s'il n'y aura pas de pullulations de printemps généralisée sur l'ensemble de la région, il est certain que, localement, les populations de campagnols atteindront et dépasseront le seuil critique en Juin.

Nous conseillons donc de surveiller attentivement les refuges : bermes, friches, les prairies artificielles ou naturelles, les cultures fourragères, les colzas, les céréales, afin d'y détecter les traces d'activités : crottes et brins d'herbe coupés à l'entrée des trous, indices qui seuls permettent d'assurer que les terriers sont habités.

En conséquence traiter les terrains infestés et protéger les cultures situées à proximité de ces terrains, en particulier les colzas et les céréales. Les prairies artificielles de légumineuses ou de graminées devront être traitées impérativement après la première coupe, si elles sont infestées.

COLZA

CHARANCON de la TIGE

Le vol avait commencé au début Février avant la période froide dans les secteurs très précoces des Charentes. Les captures ont repris depuis le début du mois. et viennent brusquement de s'intensifier depuis le 5 Mars. Les captures ont dépassé le seuil de 10 à Marigny-79, Brie-16, et surtout Jardres-86 (où plus de 100 charançons ont été piègés).

Le traitement doit être réalisé sans délai partout où les captures sont importantes (plus de 40 en captures cumulées). D'une façon générale, ce sont les zônes où on cultive le colza depuis longtemps qui sont les plus exposées. Attention, des différences très importantes d'infestation peuvent exister entre des parcelles proches : ne pas se fier à une seule cuvette dans un secteur pour évaluer les risques.

Par temps frais, préférer des produits actifs à températures faibles parathion, lindane, et traiter aux heures chaudes de la journée.

> Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Poitou-Charentes":

> > GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 9.3.81 - Précédente Note : 189 du 22.1.81

P436

2 Poitou-Chare mprimerie de la Station